

# Univoq™

Inatreq™ active

NOVO!

FUNGICID

# Zaštitite svoj usjev, farmu i budućnost.



# Univoq™

## Inatreq™ active

### FUNGICID

## Novo, jedinstveno rješenje za fleksibilnu i potpunu kontrolu bolesti žitarica



#### Aktivne tvari:

fenpikoksamid  
(Inatreq™ active) - 50 g/l  
protriokonazol - 100 g/l



#### Formulacija:

koncentrat za emulziju (EC)



samo za profesionalne  
korisnike



#### Koje su praktične prednosti?

- Jedinstven, otporan i fleksibilan fungicid
- Nova aktivna tvar fenpikoksamid, novo mjesto djelovanja
- Odlična kontrola Septoriae
- Kontrola drugih važnih bolesti žitarica
- Protektivno i kurativno djelovanje
- i-Q4™ tehnologija osigurava gotovo 100 % pokrivenosti lista i nudi dugotrajnu zaštitu
- Nema križne rezistentnosti

optimizirano  
**i-Q4™**  
tehnologijom

Kultura	Bolest	Doza	Vrijeme primjene
ozima pšenica, ozima tvrda pšenica i ozimi pir	za suzbijanje pepelnice ( <i>Blumeria graminis</i> ), žutosmeđe pjegavosti lišća pšenice ( <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> ), paleži klasa ( <i>Fusarium</i> spp.), smeđe hrđe pšenice ( <i>Puccinia triticina</i> ) i žute hrđe ( <i>Puccinia striiformis</i> )	1,5-2 l/ha	kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30-69)
jara pšenica, jara tvrda pšenica i jari pir	za suzbijanje pepelnice ( <i>Blumeria graminis</i> ), žutosmeđe pjegavosti lišća pšenice ( <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> ), paleži klasa ( <i>Fusarium</i> spp.), smeđe hrđe pšenice ( <i>Puccinia triticina</i> ) i žute hrđe ( <i>Puccinia striiformis</i> )		kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30-69)
ozima pšenoraž	za suzbijanje žute hrđe ( <i>Puccinia striiformis</i> ), smeđe hrđe ( <i>Puccinia triticina</i> ), paleži klasa ( <i>Fusarium</i> spp.) i pepelnice ( <i>Blumeria graminis</i> )		kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30-69)
jara pšenoraž	za suzbijanje žute hrđe ( <i>Puccinia striiformis</i> ), smeđe hrđe ( <i>Puccinia triticina</i> ), paleži klasa ( <i>Fusarium</i> spp.) i pepelnice ( <i>Blumeria graminis</i> )		kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30-69).
ozima raž	za suzbijanje pjegavosti lista ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ), smeđe hrđe ( <i>Puccinia recondita</i> ), žute hrđe ( <i>Puccinia striiformis</i> ) i pepelnice ( <i>Blumeria graminis</i> )		kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30-69).
jara raž	za suzbijanje pjegavosti lista ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ), smeđe hrđe ( <i>Puccinia recondita</i> ), žute hrđe ( <i>Puccinia striiformis</i> ) i pepelnice ( <i>Blumeria graminis</i> )	kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30-69)	
ozima pšenica, ozima tvrda pšenica, ozima pšenoraž i ozimi pir	za suzbijanje smeđe pjegavosti lista ( <i>Zymoseptoria tritici</i> )	2 l/ha	kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30-69)



#### Koje savjete slijediti prilikom primjene?

- Dobro se miješa s herbicidima (Pallas™, Corello™ DUO)
- Ne tretirati po vjetrovitom vremenu
- Sredstvo je preporučljivo primjenjivati preventivno ili najkasnije u početnim

fazama razvoja bolesti te izbjegavati kurativnu primjenu sredstva