

# Verben™

FUNGICID

NOVO!

**Novi fungicid za žitarice širokog spektra djelovanja, za poboljšanu kontrolu bolesti, veće prinose i kvalitetu.**

**BUDITE PONOSNI DOKLE VAM POGLED SEŽE!**





### Aktivne tvari:

prokinazid - 50 g/l  
protriokonazol - 200 g/l



### Formulacija:

koncentrat za emulziju (EC)



samo za profesionalne korisnike



### Koje su praktične prednosti?

- Širok spektar djelovanja, tehnologija formulacije za superiornu učinkovitost u polju
- Mnogo bolja efikasnost u odnosu na čisti protriokonazol
- Izuzetno djelovanje na pepelnicu zbog sinergije između prokinazida i protriokonazola
- Odlično djelovanje u različitim vremenskim uvjetima
- Snažan utjecaj na prinos

Kultura	Bolest	Doza	Vrijeme primjene
ozima i jara pšenica, ozima pšenoraž	za suzbijanje uzročnika parazitskog polijeganja ( <i>Oculimacula yallundae</i> ), pepelnice ( <i>Blumeria graminis</i> ), smeđe pjegavosti lista ( <i>Zymoseptoria tritici</i> ), smeđe hrđe ( <i>Puccinia triticina</i> ), žute hrđe ( <i>Puccinia striiformis</i> ) i žuto smeđe pjegavosti ( <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> )	0,75 do 1,0 l/ha	kod pojave prvih simptoma, od sredine busanja do vidljivog 2. koljenca (BBCH 25-32) za suzbijanje uzročnika parazitskog polijeganja, odnosno do pune cvatnje (50 % prašnika zrelo) (BBCH 65) za suzbijanje ostalih uzročnika bolesti
ozimi i jari ječam	za suzbijanje uzročnika mrežaste pjegavosti ( <i>Pyrenophora teres</i> ), sive pjegavosti ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ), pepelnice ( <i>Blumeria graminis</i> ) i smeđe hrđe ( <i>Puccinia hordei</i> )	0,75 do 1,0 l/ha	kod pojave prvih simptoma, od sredine busanja do početka klasanja (BBCH 25-49)
ozima raž	za suzbijanje sive pjegavosti ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) i pepelnice ( <i>Blumeria graminis</i> )	0,75 do 1,0 l/ha	od sredine busanja do početka klasanja (BBCH 25-49).



### Koje savjete slijediti prilikom primjene?

- Verben™ je proizvod izbora za rane aplikacije koje su kritične za kontrolu bolesti kao i za očuvanje

potencijala prinosa

- Djeluje i na nižim temperaturama
- Otporan je na ispiranje kišom - 30 mm kiše poslije 1 h od primjene

nema utjecaja na učinkovitost tretmana

- Maksimalni broj tretmana u toku vegetacije je jedanput